

## عدوى MPOX

• ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال الجسدي المباشر مع شخص مصاب تظهر عليه الأعراض، أو بشكل غير مباشر من خلال الأسطح الملوثة أو الأغراض الشخصية للأشخاص المصابين بجدرى القروء.

• كما يمكن أن تنتقل العدوى عن طريق الاتصال المباشر مع حيوان مصاب أو بشكل غير مباشر من خلال التعرض لسوائل جسمه أو آفات جلده.

## حضانة الفيروس

- من 5 أيام وقد تمتد إلى 21 يومًا.
- يعتبر المريض معديًا من وقت ظهور الأعراض حتى تقشر جميع القروح وجفافها.
- من الصعب اكتشافه خلال فترة الحضانة، قبل ظهور الطفح الجلدي.

## مرض جدرى القروء - فترة الحضانة والتشخيص

Monkey pox  
PCR TEST □ N □ P



# الأعراض الأولية للمرض:

- حمى وقشعريرة
- طفح جلدي
- صداع
- تضخم الغدد الليمفاوية
- تعب

• تترك التقرحات ندوبًا مرئية. وهناك بعض المضاعفات الخطيرة، وإن كانت نادرة جدًا، مثل الالتهاب الرئوي والعمى وتسمم الدم والتهاب الدماغ.

## الرعاية الافتراضية

• يمكن إدارة تشخيص جذري القروود وحتى إدارته في أولئك الذين لا يعانون من مضاعفات وعلاجهم افتراضيًا من دون الحاجة إلى التواجد فعليًا في المستشفى، وهو ما يحتاج أيضًا إلى استكمالهِ بتسليم الأدوية الموصوفة إلى المنزل.

• الرعاية الافتراضية هي وسيلة لتوفير رعاية آمنة ومتفوقة في أي جأحة، وخاصة لأولئك الذين يحتاجون إلى معدات الوقاية الشخصية أو تدابير التباعد الاجتماعي وهي ممتازة عندما لا يكون التفاعل ضروريًا.

## التشخيص

• يتم تشخيص جذري القروود عادةً بأخذ عينة من الجروح المفتوحة للشخص المصاب ثم إرسالها إلى المختبر لإجراء الاختبارات اللازمة. قد تكون هناك حاجة أيضًا إلى عينة دم لاختبار الأجسام المضادة لفيروس جذري القروود.

## العلاجات

• لا توجد علاجات محددة ومعتمدة لمرض جذري القروود، ولكن يتم استخدام مضادات الفيروسات المعتمدة لبعض الحالات في العلاج العرضي. وقد أثبتت فعاليتها وأمانها. يوصى باستخدام المسكنات لعلاج الآفات المؤلمة في الفم والعينين والأغشية المخاطية الأخرى

## التطعيم

• يوصى بالتطعيم في منطقة جغرافية أو شريحة معينة من المرضى إذا كان هناك زيادة في نشاط المرض في تلك المنطقة المحددة أو بين شريحة محددة من المرضى.

